

Nieuwsbrief COACT studie

Nummer 9, 14-11-2016


De COACT studie is een prospectieve, gerandomiseerde, multicenter studie naar het effect van een directe CAG (en eventuele PCI) bij patiënten na een OHCA op basis van een shockable ritme met herstel van circulatie en zonder het beeld van een STEMI of een duidelijke non-coronaire oorzaak van het arrest. Geschikte patiënten worden op de SEH gerandomiseerd naar een directe CAG dan wel een CAG na neurologisch herstel. Het consent wordt tussen dag 3 en dag 7 van patiënt of familie verkregen. Het primaire eindpunt is 90 dagen mortaliteit.

Er loopt momenteel een aantal studies met dezelfde vraagstelling:

Duitsland (TOMAHAWK):	558 patiënten, start aug 2016
Parijs (EMERGE):	970 patiënten, start okt 2016
Zweden (DISCO):	120 patiënten, start dec 2014
Arizona (PEARL):	240 patiënten, start dec 2015
Madrid (COUPE):	166 patiënten, start jan 2016

Beste onderzoekers,
Inmiddels is het Radboud UMC Nijmegen ook geïnitieerd! De inclusie verloopt goed, dit moeten we voortzetten gezien de concurrerende studies! Deze maand zijn er al 8 patiënten geïncludeerd.

Aantal inclusies per centrum




Inclusies totaal: 161

Totale streefinclusie: 552 patiënten



Inclusies in de tijd



We willen iedereen hartelijk bedanken voor hun participatie!

